

















Verzeichnis der im Forst zugelassenen Pflanzenschutzmittel

Biotechnische und biologische Insektizide

Registernummer Gefahrenklasse	Präparat / Zulassungsinhaber	Wirkstoff / Gehalt	Konzentration / Aufwandmenge	Ausbringungs- information	Wirkung gegen
2495 / 0 Xi	Foray 48B Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.	Bacillus thuringiensis var. kurstaki 24,6 g/l	Behaarte Raupen: 4 l/ha, unbehaarte Raupen 2 l/ha; unverdünnt oder 1:2 mit Wasser verdünnt	ULV-Sprühverfahren: beim Erstauftreten der Raupen, möglichst im 1. bis 3. Raupenstadium	Behaarte bzw. unbehaarte, freifressende Schmetterlingsraupen
2730 / 0 ---	Nematop E-Nema GmbH	Entomopathogene Nematoden (Heterorhabditis bacteriophora)	500.000 Nematoden pro m ² / 0,2-1 l/m ²	Gießen, spritzen: bei Befall (Mitte Juli bis Ende September)	Gartenlaubkäfer in Forstgärten
3935 / 0 ---	Ailantex Universität für Bodenkultur	Verticillium nonalfalae 10 ⁷ Konidien/ml	3 ml/Baum 5 l/ha	Stamminokulation: nach dem Austriebs	Götterbaum (<i>Ailanthus altissima</i>)

GHS-System, Gefahrenklassen	Bisheriges System, Gefahrensymbole
GHS02 	F  leichtentzündlich F+  hochentzündlich
GHS03 	O  brandfördernd
GHS05 	C  ätzend
GHS06 	T  giftig T+  sehr giftig
GHS07 	Xi  reizend
GHS08 	Xn  gesundheitsschädlich
GHS09 	N  umweltgefährlich

Auskunft: DI Bernhard Perny
Tel. +43-(0)1-87838-1103
E-Mail: bernhard.perny@bfw.gv.at

Ing. Eiko Gatterbauer
Tel. +43-(0)1-87838-1101
E-Mail: eiko.gatterbauer@bfw.gv.at